



Centre d'Imagerie Médicale de l'Ouest Parisien

*Drs. F. Baghaie, D. Ducreux, M. Ghouadni, H. Koulakian, S. Bourrelier
F. Leproux, T. Mugel, G. Roland, J. Sanchez, F. Staub, S. Taifour, F. Viry*

01 41 12 81 90
www.cimop.fr

CLINIQUE BIZET
21 rue Georges Bizet
75116 PARIS

CLINIQUE DU VAL D'OR
16 rue Pasteur
92210 SAINT-CLOUD

HOPITAL DES 4 VILLES
Rue Charles Lauer
92210 SAINT-CLOUD

HOPITAL DE SEVRES
141 Grande Rue
92310 SEVRES

HOPITAL STELL
1 Rue Charles Drot
92500 RUEIL-MALMAISON

Radiologie Générale et Dentaire, Cone-Beam, Mammographie, Echographie, Densitométrie, Scanner, IRM, Radiologie Interventionnelle

Rueil-Malmaison, le 10/10/2023

Mr THOMAS ERIC
Nom naissance : THOMAS
Né(e) le 26/10/1954
Dr. MARTIN Guillaume

Docteur Fabrice STAUB

Ancien Chef de Clinique Assistant des Hôpitaux de Paris

IRM DU RACHIS LOMBAIRE

INDICATION

Bilan de fessalgies cruralgie droite

TECHNIQUE

Sagittale T1, T2 Dixon sans et avec annulation de la graisse, axiales T2 et Coronale STIR.

RESULTATS

Canal lombaire rétréci par des processus arthrosiques étagés avec listhésis de grade I de L1 sur L2 et débords discarthrosique focaux entre L1-L2 et L5-S1 prédominant en L1-L2 et arthrose interapophysaire postérieure. Discopathie dégénérative et inflammatoire L1-L2, inflammatoire Modic 1 T10-T11 et T11-T12.

Pas de diminution de hauteur corporelle notable.

Cône terminal en L1.

Aspect d'anomalie de signal intramédullaire en T9-T10.

Débord discarthrosique à l'étage thoracique.

Hypersignal sous-chondral de l'interligne articulaire sacro-iliaque bilatérale sur le versant sacré.

À noter un aspect hypertrophique pariétal vésical global.

En L1-L2, débord discarthrosique global et arthrose foraminale bilatérale, prédominant à droite, venant contact des portions émergentes des deux racines :

L2-L3, débord discarthrosique global et arthrose foraminale bilatérale à proximité des portions émergentes radiculaires L3.

En L3-L4, débord discarthrosique global et arthrose foraminale bilatérale, au contact des portions foraminales des deux racines L3, et à proximité des portions émergentes des deux racines L4 prédominant à gauche.

En L4-L5, débord discarthrosique global et arthrose foraminale bilatérale à proximité des portions radiculaires.

En L5-S1, minime débord discarthrosique global à distance des portions radiculaires.

CONCLUSION

Lombarthrose étagée avec listhésis de grade I de L1 sur L2, zone de discopathie dégénérative inflammatoire, et zones de contact sur les portions radiculaires en L1-L2.

Aspect d'hypersignal intramédullaire à hauteur de T9-T10, à explorer par une IRM médullaire.

Appareil : Stell IRM , VOYAGER GE N° 5266872. Mise en service le 19/06/2023

Professeur DENIS DUCREUX, Validé électroniquement le 10/10/2023 7:47

Le CIMOP est certifié LRQA ISO 9001 : 2015 depuis le 15/04/2022

